

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ИМПЛАНТАЦИИ

1. До начала хирургического лечения обязательно проведение профессиональной гигиены полости рта у гигиениста.

2. В день операции:

- покушать примерно за 2 часа до операции;
- тщательно почистить зубы;
- прополоскать рот раствором хлоргексидина;
- не курить и не принимать алкоголь.
- начать прием антибиотиков — Амоксиклав 0,625 — 2 таблетки

Обязательно поставьте в известность Вашего врача, если у Вас ухудшилось самочувствие или Вы начали прием каких — либо лекарств. **После проведения процедуры имплантации.**

Вы установили дентальный имплантат — титановый штифт — аналог корня зуба. залогом долгой службы Вашего имплантата является полное соблюдение всех рекомендаций Вашего лечащего врача и тщательное выполнение индивидуальной гигиены.

В течение послеоперационного периода возможны следующие явления:

- сукровичное отделяемое из раны является нормальным в течение нескольких часов после операции;
- наличие послеоперационного отека является нормой. Отек возникает в течении нескольких часов и может нарастать до нескольких дней;
- болевой симптом является нормальным после любого хирургического вмешательства.
- соблюдение гигиены ускорит послеоперационную реабилитацию. При этом необходимо при чистке зубов не задеть и не травмировать десну;
- прием горячей пищи возможен только через 1 сутки после операции. Жевать на оперированной стороне не рекомендуется. Желателен прием пищи не требующей сильного пережевывания (супы, диетические концентраты, молочные продукты, яйца, фрукты).

Для скорейшего достижения и закрепления успешных результатов лечения принимайте, пожалуйста, следующие препараты:

1. Амоксиклав 0,625

3 раза в сутки в теч. 7 дней — 22 табл.

2. Супрастин 0,025

1 таб. 1 раз в сутки — 1 день на ночь.

3. Нимесил 0,1

по 1 порошку 3 раза в день — 3-4 дня.

4. Кеторол 0,01

по 1 таб. При болях (не более 4-х таб. в сутки с интервалом 6 часов) — 10 таб.

5. Аципол

по 1 капсуле 3 раза в сутки за 30 минут до приема пищи.

6. Curasept 0,05% раствор (или «President» с хлоргексидином)

ротовые ванночки 2-3 раза в день по 10-15 сек.

7. Солкосерил, дентальная адгезивная паста

накладывать на рану после ротовых ванночек с хлоргексидином.

8. Холод по 20 мин.

с интервалом 2 — 3 часа в течение 1 суток на область операции.

Рекомендации в 1-ю неделю после операции:

- не принимать пищу в течение 2-х часов; не курить в первые сутки после операции. о первые 2 дня пища должна быть преимущественно мягкой, протертой и умеренно теплой;
- вечером после операции и на следующий день чистить зубы, не затрагивая область операции;
- полоскать рот (не энергично!) назначенным хирургом раствором;
- исключить активную физическую нагрузку в течение 2 —х недель;
- не посещать баню, сауну, горячую ванну в течение 2-х недель;
- принимать лекарственные средства, назначенные Вашим врачом;

Явиться на осмотр к Вашему врачу на первый и на 10 день после операции. Внимание! Обязательно обратитесь к Вашему врачу, если:

- десна, продолжает припухать и боли усиливаются по истечении 3-х дней;
- у Вас общее плохое самочувствие и поднялась температура;
- имплантат прорезался через десну.

Кратность посещение гигиениста:

1. До начала хирургического вмешательства (не позднее одной недели).
2. Через месяц, после вмешательства.
3. Каждые четыре месяца.

После установки ортопедической конструкции необходимо подобрать специальные средства гигиены: пучковые щетки, ершики, ирригаторы.

Будьте здоровы!