

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА

После лечения зуба могут возникнуть постпломбировочные боли, усиливающиеся при накусывании. Боли могут сохраняться в течении 3-7 дней (можно принимать Нимесил по 1 порошку 3 раза в день, в течении 7 дней).

При возникновении сильной боли принять болеутоляющие и обратиться к лечащему врачу.

Для скорейшего выздоровления следуйте нашим рекомендациям:

- Соблюдать гигиену полости рта.
- Избегать сильных механических нагрузок (орехи, сухари).
- В течении шести месяцев поставить искусственную коронку.
- В целях профилактики сделать контрольный рентген снимок.

Если после того, как пройдет действие анестезии, вы почувствуете, что пломба завывает сразу же обратитесь к стоматологу, не дожидаясь, что все пройдет само. Если терпеть слишком долго, то со временем жевательные нагрузки будут неравномерно распределяться по всем зубам, и в итоге это приведет к воспалению зубных корней.

Если в течение недели дискомфорт сохраняется зубы продолжают реагировать на эти раздражители, сообщите об этом администратору клиники.

Рекомендуется обязательный профилактический осмотр через 6 месяцев.

Будьте здоровы!